

Condições elegíveis de idade e tipo de evidência

Eligible Conditions With Age and Type of Evidence

Todas as condições de deficiência devem ter origem antes dos 18 anos, deve-se esperar que continuem indefinidamente e resultem em limitação substancial no funcionamento adaptativo de acordo com o WAC 388-823.

Condições elegíveis específicas à idade			
Condição	0 - 3	4 - 19	20 e mais velho
Atrasos de desenvolvimento	X	X	
Deficiência Intelectual (DI)		X	X
Paralisia cerebral		X	X
Epilepsia		X	X
Autismo		X	X
Outra condição neurológica ou semelhante à deficiência intelectual		X	X

Testes aceitos como evidência de limitação substancial	
Testes cognitivos	Avaliações adaptativas
<ul style="list-style-type: none"> Stanford-Binet Escalas de inteligência Wechsler (WISC) Escala de habilidades diferenciais (DAS) Bateria de avaliação Kaufman para crianças (K-ABC) Sistema de avaliação cognitiva Das-Naglieri (CAS) Teste de habilidades cognitivas Woodcock-Johnson (WJ) Escalas de avaliação intelectual Reynolds, 2ª edição (RIAS 2) <p>Caso tenha uma deficiência auditiva, o inglês não seja seu idioma principal ou você não fale, seu FSIQ pode ser estimado usando um dos testes abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Escala de desempenho internacional Leiter - Revisada (Leiter-R) Escalas de inteligência Wechsler (WISC, WAIS, WNV) Teste abrangente de inteligência não verbal (C-TONI) Bateria de avaliação Kaufman para crianças (K-ABC) Índice de escala não verbal 	<ul style="list-style-type: none"> Escalas de comportamento adaptativo Vineland (VABS) Escalas de comportamento independente - Revisadas (SIB-R) Inventário para planejamento de clientes e agências (ICAP) Sistema de avaliação do comportamento adaptativo (ABAS)

Diagnóstico, especialista e evidências necessárias de limitação substancial		
Diagnóstico	Especialista	Limitação substancial
Atraso do desenvolvimento	Não aplicável	Atrasos de desenvolvimento
Deficiência intelectual	Psicólogo licenciado ou psicólogo escolar certificado	Avaliação do funcionamento adaptativo com uma pontuação padrão de ≤ 69 , e Avaliação psicológica com FSIQ de ≤ 69 ou Stanford-Binet IV com FSIQ de ≤ 67
Paralisia cerebral, ou Dano cerebral semelhante que causa quadriplegia, hemiplegia ou diplegia	Médico licenciado	Início antes dos 3 anos, e Evidência da necessidade de assistência física direta em qualquer 2 dos seguintes: higiene pessoal, banho, alimentação, vestimenta, mobilidade ou comunicação
Epilepsia, transtorno convulsivo	Neurologista certificado	As convulsões são incontroláveis e contínuas ou recorrentes, e Avaliação do funcionamento adaptativo com uma pontuação padrão de ≤ 69 ,
Autismo, transtorno autista (DSM-IV-TR-299.00), ou Transtorno do espectro autista (DSM-5)	Neurologista certificado; psiquiatra certificado; psicólogo certificado; pediatra certificado de desenvolvimento e comportamento; médico certificado ou enfermeiro especializado associado a um centro de autismo, centro de desenvolvimento ou centro de excelência	Evidência do início antes dos 5 anos, uma avaliação de funcionamento adaptativo com uma pontuação padrão de ≤ 69 , e para o diagnóstico DSM-5, um FSIQ de ≤ 84 (ou uma declaração escrita de que o seu autismo impede você de realizar o teste)
Outra condição neurológica ou semelhante à deficiência intelectual	Médico licenciado	Avaliação do funcionamento adaptativo com uma pontuação padrão de ≤ 69 , e FSIQ de ≤ 77 ou Stanford-Binet IV com FSIQ de ≤ 75 , ou se menor de 20 anos, pontuações em leitura geral e matemática geral ≤ 69 podem substituir o teste de FSIQ